Study or Subgroup	log[Hazard Ratio]	SE	Weight	Hazard Ratio IV, Fixed, 95% CI
9.1.1 median				
Ba 2017	0.67	0.29	24.5%	1.95 [1.11, 3.45]
Feng 2018	0.89	0.44	10.7%	2.44 [1.03, 5.77]
Zheng 2019	0.51	1.01	2.0%	1.67 [0.23, 12.06]
Subtotal (95% CI)			**37.2%**	**2.06 [1.30, 3.27]**
Heterogeneity: $Chi^2 = 0.22$, df = 2 (P = 0.89); $I^2 = 0\%$				
Test for overall effect: Z = 3.08 (P = 0.002)				
9.1.2 FC>2				
Huang 2017	1.34	0.4	12.9%	3.82 [1.74, 8.36]
Subtotal (95% CI)			**12.9%**	**3.82 [1.74, 8.36]**
Heterogeneity: Not applicable				
Test for overall effect: Z = 3.35 (P = 0.0008)				
9.1.3 NR				
Qiao 2019	0.59	0.72	4.0%	1.80 [0.44, 7.40]
Yu 2016	0.58	0.3	22.9%	1.79 [0.99, 3.22]
Zhang 2018	0.65	0.3	22.9%	1.92 [1.06, 3.45]
Subtotal (95% CI)			**49.9%**	**1.85 [1.24, 2.75]**
Heterogeneity: $Chi^2 = 0.03$, df = 2 (P = 0.99); $I^2 = 0\%$				
Test for overall effect: Z = 3.01 (P = 0.003)				
Total (95% CI)			**100.0%**	**2.11 [1.59, 2.80]**
Heterogeneity: $Chi^2 = 2.89$, df = 6 (P = 0.82); $I^2 = 0\%$				
Test for overall effect: Z = 5.21 (P < 0.00001)				
Test for subgroup differences: $Chi^2 = 2.64$, df = 2 (P = 0.27), $I^2 = 24.3\%$