| Study or Subgroup | TNM III+IV Events | TNM III+IV Total | TNM I+II Events | TNM I+II Total | Weight | Odds Ratio M-H, Random, 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.1 median** | | | | | | |
| Xia(2) 2018 | 3 | 18 | 10 | 17 | 5.9% | 0.14 [0.03, 0.67] |
| Xia 2018 | 12 | 22 | 18 | 38 | 9.3% | 1.33 [0.46, 3.82] |
| Ba 2017 | 36 | 50 | 10 | 29 | 9.9% | 4.89 [1.83, 13.06] |
| Zhou 2020 | 18 | 44 | 16 | 37 | 10.8% | 0.91 [0.37, 2.20] |
| Zheng 2019 | 51 | 89 | 15 | 42 | 12.1% | 2.42 [1.13, 5.16] |
| **Subtotal (95% CI)** | | **223** | | **163** | **48.1%** | **1.31 [0.52, 3.29]** |
| Total events | 120 | | 69 | | | |
| Heterogeneity: $Tau^2 = 0.83$; $Chi^2 = 17.03$, df = 4 (P = 0.002); $I^2 = 77\%$ | | | | | | |
| Test for overall effect: Z = 0.57 (P = 0.57) | | | | | | |
| **8.1.2 FC>2** | | | | | | |
| Huang 2017 | 20 | 38 | 10 | 35 | 10.0% | 2.78 [1.05, 7.34] |
| **Subtotal (95% CI)** | | **38** | | **35** | **10.0%** | **2.78 [1.05, 7.34]** |
| Total events | 20 | | 10 | | | |
| Heterogeneity: Not applicable | | | | | | |
| Test for overall effect: Z = 2.06 (P = 0.04) | | | | | | |
| **8.1.3 NR** | | | | | | |
| Qiao 2019 | 5 | 6 | 35 | 74 | 3.6% | 5.57 [0.62, 50.03] |
| Shi 2016 | 18 | 26 | 23 | 54 | 9.9% | 3.03 [1.12, 8.18] |
| Yu 2016 | 59 | 93 | 51 | 109 | 14.1% | 1.97 [1.12, 3.47] |
| Zhang 2018 | 54 | 92 | 79 | 137 | 14.4% | 1.04 [0.61, 1.78] |
| **Subtotal (95% CI)** | | **217** | | **374** | **41.9%** | **1.81 [1.03, 3.19]** |
| Total events | 136 | | 188 | | | |
| Heterogeneity: $Tau^2 = 0.15$; $Chi^2 = 5.82$, df = 3 (P = 0.12); $I^2 = 48\%$ | | | | | | |
| Test for overall effect: Z = 2.05 (P = 0.04) | | | | | | |
| **Total (95% CI)** | | **478** | | **572** | **100.0%** | **1.72 [1.08, 2.74]** |
| Total events | 276 | | 267 | | | |
| Heterogeneity: $Tau^2 = 0.32$; $Chi^2 = 23.94$, df = 9 (P = 0.004); $I^2 = 62\%$ | | | | | | |
| Test for overall effect: Z = 2.26 (P = 0.02) | | | | | | |
| Test for subgroup differences: $Chi^2 = 1.22$, df = 2 (P = 0.54), $I^2 = 0\%$ | | | | | | |